

正誤表

【ページ】	【誤】	【正】
14	抗 TNF 阻害薬	TNF 阻害薬
27	製品名エレン	製品名エレン／ノイン
28	ホパテン酸	ホパンテン酸
32	探索的試験は	探索的試験では
33	No Observable Adverse Effect Level	No Observed Adverse Effect Level
36	慈恵医科大学	東京慈恵会医科大学
38	2 重盲検	二重盲検
43	一般的である臨床第 I 相試験で	一般的である。臨床第 I 相試験で
50	通常プラセボが使用されるが、	通常対照としてプラセボが用いられるが、
52 表 7-1	H2RA	H2RA
52 表脚注	ヒスタミン 2 受容体拮抗剤	ヒスタミン H2 受容体拮抗剤
52	クトネル・ベネット	アクトネル/ベネット
53	用法用量に関連する使用上の注意	用法及び用量に関連する注意
54	ゾーミック	ゾーミックグ
57	2 重盲検	二重盲検
62	イマチニブ	イマチニブ〔製品名：グリベック〕
63	イマチニブ〔製品名：グリベック〕	イマチニブ
64	ニコチン酸トコフェロール	トコフェロールニコチン酸エステル
64	ヒスタミン 2 受容体拮抗剤	ヒスタミン H2 受容体拮抗剤
65	慈恵医大青戸病院	東京慈恵会医科大学附属青戸病院
75	主観的睡眠時間において	主観的睡眠時間の変化量において
75	観察期を	観察期 (run-in period) を